

LIQUEN PLA ORAL

Forma clínica reticulada:

Àcid retinoïc 0.05-0.1%
Excipient adhesiu oral / Gel adhesiu oral csp 30 g

Acetònid de triamcinolona 0.1%
Àcid retinoïc 0.05-0.1%
(Clotrimazol 1%)
Excipient adhesiu oral / Gel adhesiu oral csp 30 g

Aplicar una petita quantitat amb un bastonet sobre la zona afectada, 3 cops al dia, no menjar ni beure fins a 1 hora després de l'aplicació.

Forma clínica erosiva:

(*) Acetònid de triamcinolona 0.1% / Propionat de clobetasol 0.025%
Excipient adhesiu oral csp 30 g

2-3 aplicacions al dia en pel·lícula fina sobre la lesió, es recomana no beure ni menjar durant l'hora següent a l'aplicació.

Propionat de clobetasol 0.05%
Clotrimazol 2%
Excipient adhesiu oral / Gel adhesiu oral csp 30 g

1-2 aplicacions al dia en pel·lícula fina sobre la lesió, es recomana no beure ni menjar durant l'hora següent a l'aplicació.

Ciclosporina 5-10%
Solució oliosa csp 50 ml

Tacròlimus 0.05%
Solució aquosa csp 100 ml

Eficàcia no demostrada. Casos relacionats amb inducció tumoral.

(*) Finançada pel Servei Català de la Salut.