

PRUIJA SINE MATERIA

Polidocanol 15%
Oli de soja csp 100 ml

1 tap a la banyera durant 10 minuts al dia. Utilitzat amb èxit al pruija urèmic.

Urea 4-8%
Àcid glicòlic 5-10%
Oli onagra 1-2%
Alantoïna 0.5%
Polidocanol 2-4%
Loció o/w csp 200g

2 aplicacions al dia en zones de pruija.

Ictiol 1%
Mentol 0.2%
Alcanfor 0.2%
Crema base beeler csp 60 g

Aplicar 1-3 cops al dia en capa fina sobre la zona afectada amb massatge suau.

Ictiol 1%
Mentol 0.3%
Alcanfor 0.3%
Loció de calamina csp 200 ml

Aplicar sobre la zona afectada neta i seca, 3-4 vegades al dia. Tendència a la separació de fases, agitar abans de cada aplicació.

Capsaicina 0.025- 0.075%
Emulsió o/w csp 30 g

Augmentar dosi cada 3-5 dies fins assolir la dosi eficaç per a cada pacient. Indicat en pruija localitzada.

Mentol 0.25-0.5%	Hidrocortisona 1%
Prednicarbat 0.25% (acetònid de triamcinolona 0.1%)	Ictiol 1%
Aloe vera 10%	Mentol 1%
Loció o/w 250 g (loció corporal)	Emolient o/w csp 250 g

(*)Lidocaina clorhidrat 5%
Mentol 0.2%
Alcanfor 0.2%
Loció o/w csp 100 g

Aplicar d'1 a 3 vegades al dia en capa fina sobre la pell afectada amb massatge suau.

(*) Finançada pel Servei Català de la Salut.