

## ROSÀCIA FACIAL I OCULAR

Clonidina clorhidrat 25-50mcg (gammas) Per a 1 cap. N=90	1 comprimit cada 8h Indicat per a la fase eritematosa i flushings Introducció progressiva per efectes secundaris (hipotensió, sequedat boca, restrenyiment).
Lloció de Calamina csp 150g Sulfacetamida 10% Sofre 5%	1 aplicació a la nit Si irrita, retirar
Crema base beeler csp 30g (Hidro cortisona 0.05%) Metronidazol 1% Clindamicina 2%	Fase papulopustulosa
Emulsió W/S csp (crema gel o gel hidroalcohòlic) 50g Metronidazol 0.75-1% Eritromicina 2% o Clindamicina 2%	Fase papulopustulosa
Crema pells sensibles csp 50g (emulsió W/S) Metronidazol 1% Clindamicina 2% Enoxolona 0.5% Àcid hialurònic 0.5% Tacròlimus 0.03%	Fase papulopustulosa Pacients cortico - dependents
Emulsió W/S csp 60g (crema gel, crema aquosa BP) Metronidazol 0.7-1% Àcid azelaic 15%	Fase papulopustulosa lleu moderada
Solució estèril csp 5ml (coliri) Metronidazol 0.5%	Rosàcia ocular
Pomada oftàlmica csp 15g Metronidazol 0,75%	Rosàcia ocular