

Clioquinol

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Clioquinol, també anomenat vioformo o iodoclorohidroxiquina, una substància amb propietats antibacterianes i antifúngiques. Químicament és el 5-clor-7-iode-8-quinolinol.

LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL clioquinol:

- **MEDICAMENTS:**

- o VIA ORAL: El clioquinol s'ha utilitzat per via oral com amebicida intestinal i com tricomonocida vaginal. Per via oral pot donar lloc a una dermatitis sistèmica si ha existit una prèvia sensibilització per contacte.

- o VIA TÒPICA: s'utilitza en pomades i cremes per a ús mèdic i veterinari com antimicòtic i antibacterià: antibiòtics tòpics, cremes antifúngiques, pomades per embenats per al tractament d'infeccions en ferides i èczemes. Es pot utilitzar en combinació amb corticosteroides.

- També s'ha utilitzat com a desinfectant de superfícies d'habitacions i en la conservació del tabac.

Pot provocar una coloració marró en les ungles i erupcions del tipus de "eritema multiforme".

CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL clioquinol:

- Comuniqui seva al·lèrgia al metge perquè li recomani o recepti productes que no continguin clioquinol ni qualsevol dels seus sinònims * o productes relacionats. Els preparats tòpics amb clioquinol s'utilitzen sovint en embenats quirúrgics (preparats antibiòtics). Quan necessiti un antibiòtic tòpic, sol·liciti una alternativa innòcua i segura.

- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic al clioquinol i sol·liciti productes exempts d'aquest al·lèrgen.

- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol·liciti informació als responsables de la seva empresa sobre els productes i materials que poden contenir clioquinol en la composició. Eviti el contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma adequada.

* Llista de sinònims i productes relacionats: Iodoclorohidroxiquina, Vioformo, ster, Clorquinaldol.

- Aquesta llista pot no estar completa.

- Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.