

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER L'ESCLERODÈRMIA SISTÈMICA (ES)

Un pacient té esclerodèrmia sistèmica si compleix un criteri major o dos o més criteris menors

Criteris majors
<ul style="list-style-type: none">• Esclerodèrmia proximal• Engrossiment, retracció i induració simètrica de la pell dels dits i de la pell proximal a les articulacions metacarpofalàngiques. Els canvis poden afectar tota l'extremitat, la cara, el coll i el tronc (tòrax i abdomen).
Criteris menors
<ol style="list-style-type: none">1. Esclerodactília. Els canvis prèviament esmentats però limitats als dits de les mans.2. Cicatrius digitals o pèrdua de substància dels palpissos dels dits: àrees deprimides a les puntes dels dits o pèrdua de teixit als palpissos, com a resultat d'isquèmia.3. Fibrosi pulmonar basal bilateral. Patró reticular de densitats lineals o lineonodulars bilaterals, més pronunciat a les bases dels dos pulmons a l'estudi radiològic de rutina; pot tenir l'aparença de clapejat difús o pulmó "en bresca d'abella". Aquests canvis no han de ser atribuïbles a malaltia pulmonar primària.

The American Rheumatism Association. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee. Arthritis Rheum. 1980 May;23 (5):581-590.