

CRITERIS DIAGNOSTICS DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDICA (SAF)

És diagnòstic de SAF la presència d'un criteri clínic més un altre analític en més d'una ocasió separats per un interval superior a 8 setmanes i sense reunir criteris de LES ni cap altra entitat clínic.

A) MANIFESTACIONS CLÍNIQUES
<ul style="list-style-type: none">- Trombosi arterial i/o venosa- Avortaments i/o morts fetals de repetició- Trombocitopènia
B) PARAMETRES DE LABORATORI
<ul style="list-style-type: none">- Anticossos anticardiolipina (IgG)- Anticoagulant lúpic- Anticossos anticardiolipina IgM i AL

Harris. Br J Rheumatol 1987; 26:19

CRITERIS DIAGNOSTICS DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDICA (SAF)

Diagnòstic definitiu de SAF: 2 ó més manifestacions clínicas més les manifestacions analítiques.

Diagnòstic probable: 1 manifestació clínic i xifra elevada d' anticossos antifosfolípídics (aAFL) o 2 ó més manifestacions clínicas i nivells baixos d'aAFL (IgG o IgM > 2 i < o igual a 5 desviacions estàndard).

A) MANIFESTACIONS CLÍNIQUES
<ul style="list-style-type: none">- Pèrdua fetal recidivant- Anèmia hemolítica- Trombocitopènia- Trombosi venosa- Trombosi arterial- Úlcera a la cama- Lívedo reticularis
B) MANIFESTACIONS ANALÍTiques
Nivell alt d'anticossos antifosfolípíd (IgG o IgM > 5 Desviacions Estàndard)

Alarcon Segovia. Sem Arthritis Rheum 1992;21:275-286.