

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER LA SÍNDROME DE SJÖGREN (SS)

Cal complir els 4 criteris per establir el diagnòstic de Síndrome de Sjögren. Si només se'n compleixen 3 parlem de síndrome de Sjögren possible:

A. QUERATOCONJUNTIVITIS SECA.
<ol style="list-style-type: none">1. Prova de Schirmer positiva: introducció d'una tira de paper secant mil·límetrat en el fons de sac conjuntival, que no s'humiteja més enllà de 9 mm després de 5 minuts, i2. Rosa de Bengala positiva: instil·lació a la conjuntiva d'una gota de rosa de Bengala, observant la coloració amb una llum de fenedura, o3. Prova de fluoresceïna positiva: instil·lació de fluoresceïna mesurada amb un fluorofotòmetre i determinat el temps que tarda en desaparèixer.
B. XEROSTOMIA.
<ol style="list-style-type: none">1. Síntomes de sequetat bucal, i2. Disminució de la secreció salival basal i després de l'estímul
C. BIÒPSIA POSITIVA DE GLÀNDULA SALIVAL MENOR. Per a una valoració real cal la presència de cinc glàndules accessòries i s'ha d'observar en un espai de 4 mm ² la presència d'infiltració per un nombre superior a 50 limfòcits, atrofia acinar i dilatació ductal. Per tal de considerar la biòpsia positiva cal que existeixin un o més d'aquests focus d'inflamació
D. DADES DE LABORATORI DE MALALTIA AUTOIMMUNE
<ul style="list-style-type: none">• Factor reumatoide positiu, o• Anticòsos antinuclears positius, o• Anticòsos anti-Ro o anti-La positius
Criteris d'exclusió
<ol style="list-style-type: none">1. Limfoma preexistent.2. Malaltia d'injert contra hoste.3. Immunodeficiència adquirida (SIDA).4. Sarcoidosi

Fox RI, Robinson CA, Curd JG et al. Sjögren's Syndrome. Proposed criteria for classification. Arthritis Rheum 1986; 29: 577-585).