

ALOPECIA AREATA

Solució hidroalcohòlica (gel hidroalcohòlic) csp 50ml Propionat de clobetasol 0.05% Minoxidil 5%	Aplicar a la NIT sobre clapes d'alopecia areata del cuir pilós, durant 3 mesos.
Solució hidroalcohòlica (gel hidroalcohòlic) csp 100ml Minoxidil 4-5% Clobetasol 0,05% o triamcinolona acet 0,1% o hidrocortisona 1% Àcid retinoic 0,03-0,05% (Propilenglicol 10%)	Variem la potència del corticoide segons la zona a tractar i el temps que rpeveiem que precisarà del tractament.
Pegat de difenciprona al 2% Tira de pegats per a test epicutani amb difenciprona en vaselina al 0.0001%; 0.001%; 0.01%; 0.05%; 0.1%; 0,5% Acetona csp 50 cc Difenciprona 0.0001-2%	Aplicar fins que produeixi picor o retirar a les 48h després de l'aplicació Realitzar a les 2 setmanes de la sensibilització. Aplicar a l'esquena segons s'indica i retirar a les 48h. Detectarem així la concentració que produeix el mínim eritema i serà per la qual el pacient iniciarà l'aplicació a les clapes de cuir pilós. Escollirem la concentració en funció del resultat de la prova epicutània. Aplicarem en una zona del cuir pilós, i repetirem l'aplicació cada 48-72hores, vigilant els signes d'èczema agut de contacte.