

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER L'ARTRITIS REUMATOIDE (AR)

una puntuació de $\geq 6/10$ és necessària per a la classificació d' un pacient amb AR definitiva

A. Compromís articular	
1 articulació gran	0
2-10 articulacions grans	1
1-3 articulacions petites (amb o sense compromís d'articulacions grans)	2
4-10 articulacions petites (amb o sense compromís d'articulacions grans)	3
> 10 articulacions (almenys 1 petita)	5
B. Serologia (almenys 1 resultat positiu)	
Factor reumatoide (FR) negatiu y anticòs anti proteïna citrulinada (ACPA) negatiu	0
FR dèbil positiu o ACPA dèbil positiu	2
FR fort positiu o ACPA fort positiu	3
C. Reactants de fase aguda	
PCR Normal i VSG normal	0
PCR anormal o VSG anormal	1
D. Duració de la simptomatologia	
<6 setmanes	0
≥ 6 setmanes	1

Funovits J, Aletaha D, Bykerk V, Combe B, Dougados M, Emery P, Felson D, Hawker G, Hazes JM, Huizinga T, Kay J, Kvien TK, Smolen JS, Symmons D, Tak PP, Silman A. The 2010 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for rheumatoid arthritis: methodological report phase I. Ann Rheum Dis. 2010 Sep;69(9):1589-95