

**CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DEL COL·LEGI AMERICÀ DE REUMATOLOGIA (ACR 1990)  
PER LA SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS**

Es requereixen 4 o més d'aquests 6 criteris per afirmar que un pacient té una síndrome de Churg-Strauss.

La presència de 4 o més criteris té una especificitat del 99.7% i una sensibilitat del 85%.

1. Asma	
2. Eosinofília > 10% en el recompte de cèl·lules blanques sanguínies	
3. Mononeuropatia o polineuropatia	Desenvolupament de mononeuropatia, mononeuritis múltiple o polineuropatia (exemple: distribució guants-mitjons) atribuïbles a vasculitis
4. Infiltrats pulmonars canviants	Infiltrats pulmonars migratoris o transitoris a les radiografies (sense incloure infiltrats fixes) atribuïbles a vasculitis sistèmica
5. Anomalies sinus paranasals	Història de dolor/sensibilitat agut o crònic sinus paranasal o opacificació radiològica de sinus paranasals
6. Eosinòfils extravasculares	Biòpsia, incloent artèria/ arteriòla o vènula, mostrant acumulacions d'eosinòfils a àrees extravasculares.

Masi AT, Hunder GG, Lie JT, Michel BA, Bloch DA, Arend WP, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Churg-Strauss syndrome (allergic granulomatosis and angiitis). *Arthritis Rheum* 1990; **33**:1094-100.