

BUDESONIDE

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Budesonide, un corticosteroide no halogenat potent, amb activitat principalment glucocorticoide. Pertany al grup B de la classificació dels corticoides (igual que la triamcinolona acetònid). Per analogia estructural amb altres molècules de corticoides, ha demostrat ser útil com a marcador per detectar al·lèrgies a corticoides.

El GRUP B inclou: triamcinolona, amcinonido, desonida, amcinonida, budesonida, fluocinilon acetona, halcinonid, flucinonide, hidrocortisona 17 butirat, hidrocortisona butirat i valerat, propionat de Clobetasol, butirat, betametasona valerat i dipropionat, prednicarbat, fluocortolona hexanoat i pivalat, aclometasona dipropionat.

LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL BUDESONIDE:

• **MEDICAMENTS TÒPICS I INHALATÒRIA** Inhalatòria: El budesonide s'utilitza en preparats tòpics i també en productes inhalatoris per al tractament de l'asma i la rinitis al·lèrgica.

CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL BUDESONIDE:

Utilitzar únicament preparats medicinals tòpics i inhaladors que no continguin budesonide o qualsevol dels seus sinònims * entre els seus ingredients.

La llista de medicaments tòpics / inhaladors que cal evitar és la següent:

- Demotest 0,025% Crema
- Demotest 0,025% Pomada
- Pulmicort
- Olfex
- Budesonida Aldo Union
- Pulmictan
- Miflonide
- Novopulm
- Symbicort
- Rilast
- Neo Rinactive
- Rhinocort
- Budesonida nasal Merck

* Llista de sinònims i productes relacionats: Hidrocortisona butirat.

- Aquesta llista pot no estar completa.
- Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.