

FORMALDEHID

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al formaldehid, un sensibilitzant molt comú en la indústria, a la llar i en medicina.

L'exposició al · lergen pot ser directa oa través d'una gran diversitat de productes i reactius en molts processos químics, per antimicrobians alliberadors de formaldehid, plàstics polimeritzats, fluids utilitzats en metal · lúrgia, medicaments, teixits, cosmètics i detergents.

LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL Formaldehid:

- **COSMÈTICS I MEDICAMENTS:** el formaldehid s'utilitza com antitranspirant, antimicòtic, desinfectant (col · lutoris, pastilles per la gola), conservador (xampús) i queratolític. Per tots aquests usos pot formar part d'una àmplia varietat de cosmètics i medicaments: solució per a permanents, sabons, locions de mans i corporals, pomades, pols, enduridors d'ungles, laques d'ungles, dentífrics, preparats per berrugues, etc.
- Forma part del fluid per embalsamar i del fixador de teixits histològics.
- **INDÚSTRIA TÈXTIL:** roba (acabats tèxtils, especialment melamina i urea formaldehid que es troben presents en grans quantitats en els "blue jeans").
- **PRODUCTES INDUSTRIALS:** en la construcció, tintes i colorants de plàstics, fotografia (estabilitzador fotogràfic), indústria del paper, fluids utilitzats en metal · lúrgia, refinació de la gasolina i el petroli, etc.
- **LLAR:** llumins, decapants, esmalts i pintures en juguines, coles per gomes, agents per a la neteja en sec (neteja de catifes), abrillantadors de sòls, termòmetres, productes per a la neteja de sòls i finestres, assecadors de roba, ambientadors, adhesius utilitzats en sabateria, etc. per a la
- **AGRICULTURA:** aerosols (per fumigació) germicides i fungicides per a plantes i grans.

CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL Formaldehid:

- Petites quantitats de formaldehid són molt difícils d'evitar.
- En general, s'aconsella rentar la roba nova diverses vegades amb aigua calenta abans del seu ús. Evitar roba resistent a l'arrugat. Generalment els teixits de cotó 100%, polièster, niló i fibres acríliques contenen menys formaldehid.
- Atès que el formaldehid es troba en cosmètics i medicaments, és important utilitzar productes convenientment etiquetats en què no aparegui el formaldehid, els seus sinònims * o altres productes alliberadors de formaldehid entre els seus ingredients.
- Segons la normativa de cosmètics de la Unió Europea, es permeten concentracions de formaldehid per sota del 0,2%. Un 0,05% és el límit establert a partir del qual s'ha de etiquetar el producte indicant "conté formaldehid".
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic al formaldehid i sol·liciti productes exempts d'aquest al · lergen.
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol·liciti informació als responsables de la seva empresa sobre els productes i materials que poden contenir formaldehid en la composició. Eviti el contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma adequada.

* Llista de sinònims i productes relacionats: CH₂O, formalina, aldehyd fòrmic, formol, HCHO, metanal, metil aldehyd, metilè òxid, oxometano, oximetileno, Bronopol TM (2-brom-2-nitropropano-1,3-diol), Germall [®] II (diazolidinil urea), Germall [®] 115 (imidazolidinil urea), Quaternium 15, Tris-Nitro [®] (tris (hidroximetil) nitro-metà, Dowicil [®] 75, Grote [®] BK, Dowicil [®] 200, DMDM hidantoïnes, hexametilentetramina, paraformaldehyd.

- Aquesta llista pot no estar completa.
- Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.