

KATHON CG

La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al Kathon CG, una barreja registrada de dues substàncies del grup de les isotiazolinonas (metilcloroisotiazolinona + metilisotiazolinona) utilitzada com a conservador (antibacterià i antifúngic) en cosmètics, productes industrials i productes domèstics.

LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL KATHON CG:

- **COSMÈTICS:** cremes hidratants, maquillatges, pols, autobronzejadors, filtres solars, desmaquilladors, ombres d'ulls, mascaretes, xampús, sabons líquids, condicionadors capil·lars, gels, tovalloletes humides i altres productes per a la bellesa i la cura del cutis.
- **PRODUCTES INDUSTRIALS:** taladrines, fabricació del paper, fluids utilitzats en metal·lúrgia, aigua per a refrigeració, sistemes d'aire condicionat, emulsions de làtex, colorants, tintes, adhesius, líquids per radiografies.
- **PRODUCTES DOMÈSTICS:** productes per a la neteja de la llar, productes per a la neteja de piscines, pintures domèstiques, etc.

CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES AL KATHON CG:

- Utilitzeu només productes cosmètics en els que vinguin especificats tots els seus components i que no continguin Kathon CG o qualsevol dels seus sinònims * o productes relacionats.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic al Kathon CG i sol·liciti productes exempts d'aquest al·lèrgen.
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol·liciti informació als responsables de la seva empresa sobre els productes i materials que poden contenir Kathon CG en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma adequada.

* Llista de sinònims i productes relacionats: Metilcloroisotiazolinona (MCI), Metilisotiazolinona (MI), 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 5-clor-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, ACTIC, Alquicid CH50, Amerstat 250, Euxyl® K100, Izolin GR 856, Grote® TK2, Metatin GT, MITC cc Mx 323, Parmetol.

- Aquesta llista pot no estar completa.
- Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.