

CRITERIS DIAGNOSTICS DE POLIMIOSITIS I DERMATOMIOSITIS

A) POLIMIOSITIS

Polimiositis definida : 4 criteris, Polimiositis probable : 3 criteris, Polimiositis possible : 2 criteris

B) DERMATOMIOSITIS

En tots els casos ha d'incloure el criteri E +

Dermatomiositis definida : 3 criteris, Dermatomiositis probable : 2 criteris, Dermatomiositis possible : 1 criteri

A) DEBILITAT MUSCULAR PROXIMAL I SIMÈTRICA
Afectació en la majoria dels casos de cintura escapular i pelviana. En casos aguts o de llarga evolució pot existir també debilitat distal
B) ELEVACIÓ DELS ENZIMS MUSCULARS
Marcadors de lesió muscular: CPK, LDH, GOT, GPT i Aldolasa
C) ALTERACIONS ELECTROMIOGRÀFIQUES COMPATIBLES
1. Augment de l'activitat d'inserció amb presència d'activitat de repòs, manifestada per fibril·lacions i ones agudes positives (dents de serra) 2. Potencials d'unitat motora de característiques miopàtiques amb disminució de l'amplitud i duració i augment de la polifasia 3. Descàrregues peculiars repetitives d'alta freqüència (pseudomiotònica)
D) BIOPSIA MUSCULAR COMPATIBLE
Presència de fibres degenerades i necròtiques, juntament amb un infiltrat inflamatori format per limfòcits i macròfags amb algunes cèl·lules plasmàtiques i ocasionalment PMN en fases inicials. L' infiltrat es localitza perivascular i perifascicularment.
E) MANIFESTACIONS CUTANIES
Pàpules de Gottron i eritema en heliotrop

Cal excloure:

1. Malaltia neurològica central o perifèrica
2. Infeccions del múscul
3. Ingesta de fàrmacs o tòxics
4. Malalties musculars metabòliques
5. Rabdomiòlisi de causa coneguda
6. Malalties endocrines
7. Historia familiar suggestiva de distròfia muscular
8. Presència de granulomes sarcoideus a la biòpsia