

# **CRITERIS DIAGNÒSTICS DE PSEUDOXANTOMA ELÀSTIC (PXE) (Lebwohl et al., 1994)**

## **Criteris majors**

1. Afectació cutània característica (pàpules grogues en empedrat en flexures)
2. Troballes histopatològics característics de pell lesional (tinció de fibres elàstiques i tinció de calci o de von kossa)
3. Malaltia ocular característica (estries angioides, hiperpigmentació clapada o peau d'Orange, maculopatia) en adults majors de 20 anys

## **Criteris menors**

1. Troballes histopatològics característics en pell sana (tinció de fibres elàstiques i tinció de calci o de von kossa)
2. Història familiar de pseudoxantoma elàstic en familiars de primer grau

## **Classificació de pacients segons els criteris:**

**1. Categoria I: Casos confirmats de PXE:** pacients que compleixen els 3 criteris majors

**2. Categoria II: Casos amb d'PXE incerts:**

**Ila:** estries angioides + 2 criteris menors

**Ilb:** estries angioides + troballes histopatològiques característics en pell sana

**Ilc:** estries angioides + història familiar de pseudoxantoma elàstic en familiars de primer grau

**Ild:** troballes histopatològiques característics en pell sana + història familiar de pseudoxantoma elàstic en familiars de primer grau