

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER L'ARTERITIS DE TAKAYASU

Per diagnosticar un pacient de Arteritis de Takayasu cal que compleixi tres o més dels següents sis criteris:

1. Edat d'inici de la malaltia igual o menor a 40 anys
2. Claudicació d'extremitats. Desenvolupament i empitjorament de la fatiga i malestar als músculs d'una o més extremitats amb l'activitat, especialment de extremitats superiors.
3. Disminució del pols de l'artèria braquial (d'una o ambdues artèries braquials)
4. Pressió arterial diferencial major de 10 mmHg (diferència entre la pressió sistòlica dels dos braços superior a 10 mmHg)
5. Buf audible a l' auscultació a nivell de l'aorta o sobre una o ambdues artèries subclàvies
6. Arteriografia anormal Oclusió arteriogràfica total o parcial de tota l'aorta, les seves branques primàries o grans artèries a la zona proximal d'extremitats superiors i inferiors, no sent atribuïble a aterosclerosi, displasia fibromuscular o causes similars; canvis habitualment focals o segmentaris

Arend WP, Michel BA, Bloch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Takayasu arteritis. Arthritis Rheum 1990; 33 (8): 1129-34.