

## **LIQUEN PLANO ORAL**

### **Forma clínica reticulada:**

Ácido retinoico 0.05-0.1%

Excipiente adhesivo oral / Gel adhesivo oral csp 30 g

Acetónido de triamcinolona 0.1%

Ácido retinoico 0.05-0.1%

(Clotrimazol 1%)

Excipiente adhesivo oral / Gel adhesivo oral csp 30 g

Aplicar una pequeña cantidad con un bastoncillo sobre la zona afectada, 3 veces al día, no comer ni beber hasta 1 hora después de la aplicación.

### **Forma clínica erosiva:**

(\*) Acetónido de triamcinolona 0.1% / Propionato de clobetasol 0.025%

Excipiente adhesivo oral csp 30 g

2-3 aplicaciones al día en película fina sobre la lesión, se recomienda no beber ni comer durante la hora siguiente a la aplicación.

Propionato de clobetasol 0.05%

Clotrimazol 2%

Excipiente adhesivo oral / Gel adhesivo oral csp 30 g

1-2 aplicaciones al día en película fina sobre la lesión, se recomienda no beber ni comer durante la hora siguiente a la aplicación.

Ciclosporina 5-10%

Solución oleosa csp 50 ml

Tacrólimus 0.05%

Solución acuosa csp 100 ml

Eficacia no demostrada. Casos relacionados con inducción tumoral.

(\*) Financiada por el Servei Català de la Salut.