

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA POLIARTERITIS NODOSA (PAN)

Se requiere la presencia de al menos 3 de los 10 criterios para decir que un paciente sufre de PAN (especificidad del 86.6% y una sensibilidad del 82.2%).

1. Pérdida de peso \geq 4 kg	Desde el inicio de la enfermedad, no debida a dieta o a otros factores
2. Livedo reticularis	
3. Dolor o hipersensibilidad testicular	No debida a infección, traumatismo o otras causas
4. Mialgias, debilidad o dolor al tacto de les extremidades inferiores.	Mialgias difusas (excluyendo cintura escapular y pélvica) o debilidad de los músculos o hipersensibilidad al tacto de los músculos de las piernas
5. Mononeuropatía o polineuropatía	Desarrollo de mononeuropatía, mononeuritis múltiple o polineuropatía
6. Presión arterial diastólica > 90 mmHg	
7. Elevación de BUN o creatinina	no debida a deshidratación u obstrucción
8. Virus hepatitis B	HBsAg o AC en suero
9. Alteraciones arteriográficas	Arteriografía con aneurismas u oclusiones de arterias viscerales, no debidas a arteriosclerosis, displasia fibromuscular o otras causas no inflamatorias
10. Biopsia de arteria de pequeño o mediano calibre con neutrófilos polimorfonucleares	

Lightfoot RW Jr, Michel BA, Bloch DA, Hunder GG, Zvaifler NJ, McShane DJ, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of polyarteritis nodosa. *Arthritis Rheum* 1990; **33**: 1088-93.