

## ROSÁCEA FACIAL Y OCULAR

Clonidina clor.25-50mcg (gammas) Para a 1 cap. N=90	1 comprimido cada 8h Fase eritematosa Introducción progresiva por efectos secundarios (hipotensión, sequedad boca, estreñimiento).
Loción de Calamina csp 150g Sulfacetamida 10% Azufre 5%	1 aplicación por la noche Si irrita, retirar
Crema pieles sensibles csp 50g Aloe vera 10% Enoxolona 0.5-1%* Alfa bisabolol 1% Ex. Gl. Avena 5% Ácido hialurónico 0.5%	Fase eritematosa  * Propiedades antiinflamatorias
Crema base beeler csp 30g Hidrocortisona 0.05% Metronidazol 1% Clindamicina 2%	Fase papulopustulosa
Emulsión W/S csp (crema gel o gel hidroalcohólico) 50g Metronidazol 0.75-1% Eritromicina 2% o Clindamicina 2%	Fase papulopustulosa
Crema pieles sensibles csp 50g (emulsión W/S) Metronidazol 1% Clindamicina 2% Enoxolona 0.5% Ácido hialurónico 0.5% Tacrólimus 0.03%	Fase papulopustulosa Pacientes cortico - dependientes
Emulsión W/S csp 60g (crema gel, crema acuosa BP) Metronidazol 0.7-1% Ácido azelaico 15%	Fase papulopustulosa leve - moderada
Solución estéril csp 5ml (colirio) Metronidazol 0.5%	Rosácea ocular

Pomada oftálmica csp 15g Metronidazol 0.5-0.7%	Rosácea ocular
---	----------------