

PRURITO SINE MATERIA

Polidocanol 15%
Aceite de soja csp 100 ml

1 tapón en la bañera durante 10 minutos al día. Utilizado con éxito en el prurito urémico

Urea 4-8%
Ácido glicólico 5-10%
Aceite onagra 1-2%
Alantoína 0.5%
Polidocanol 2-4%
Loción o/w csp 200g

2 aplicaciones al día en zonas de prurito.

Ictiol 1%
Mentol 0.2%
Alcanfor 0.2%
Crema base beeler csp 60 g

Aplicar 1-3 veces al día en capa fina sobre la zona afectada con masaje suave.

Ictiol 1%
Mentol 0.3%
Alcanfor 0.3%
Loción de calamina csp 200 ml

Aplicar sobre la zona afectada limpia y seca, 3-4 veces al día. Tendencia a la separación de fases, agitar antes de cada aplicación.

Capsaicina 0.025- 0.075%
Emulsión o/w csp 30 g

Aumentar dosis cada 3-5 días hasta alcanzar la dosis eficaz para cada paciente. Indicado en prurito localizado.

Mentol 0.25-0.5%
Prednicarbato 0.25% (acetónido de triamcinolona 0.1%)
Hidrocortisona 1%
Ictiol 1%

Aloe vera 10%
Loción o/w 250 g (loción corporal)

Mentol 1%
Emoliente o/w csp 250 g (*)

(*)Lidocaína clorhidrato 5%
Mentol 0.2%
Alcanfor 0.2%
Loción o/w csp 100 g

Aplicar d'1 a 3 veces al día en capa fina sobre la piel afectada con masaje suave.

Doxepina 5% en emulsión o/w csp 100 gramos