

**CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DEL COL·LEGI AMERICÀ DE REUMATOLOGIA (ACR 1990)
PER LA POLIARTERITIS NODOSA (PAN)**

Es requereix la presència d' almenys 3 d'aquests 10 criteris per dir que un pacient té una PAN.

La presència de 3 o més criteris té una especificitat del 86.6% i una sensibilitat del 82.2%.

1. Pèrdua ponderal \geq 4 kg	Pèrdua de pes \geq 4 kg des de l'inici de la malaltia, no deguda a dieta o altres factors
2. Livedo reticularis	
3. Dolor o hipersensibilitat testicular	No degut a infecció, traumatisme o altres causes
4. Miàlgies, debilitat o dolor al tacte de les extremitats inferiors.	Miàlgies difuses (excloent cintura escapular i pèlvica) o debilitat dels músculs o hipersensibilitat al tacte dels músculs de les cames
5. Mononeuropatia o polineuropatia	Desenvolupament de mononeuropatia, mononeuritis múltiple o polineuropatia
6. Pressió arterial diastòlica > 90 mmHg	Desenvolupament d'hipertensió arterial amb diastòlica major de 90 mmHg
7. Elevació de BUN o creatinina	Elevació de BUN > 40 mg/dL o creatinina > 1.5 mg/dL, no deguda a deshidratació o obstrucció
8. Virus hepatitis B	Presència de HBsAg o anticossos al sèrum
9. Anomalies arteriogràfiques	Arteriografia mostrant aneurismes o oclusions d'artèries viscerals, no degudes a arteriosclerosi, displàsia fibromuscular o altres causes no inflamatòries
10. Biòpsia d'artèria de petit o mitjà calibre amb polimorfonuclears neutròfils	Canvis histològics mostrant la presència de granulòcits o granulòcits i leucòcits mononuclears a la paret arterial

Lightfoot RW Jr, Michel BA, Bloch DA, Hunder GG, Zvaifler NJ, McShane DJ, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of polyarteritis nodosa. *Arthritis Rheum* 1990; **33**: 1088-93.