

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-----------------------------------|---------------------|-----|--|--|-----|-------------------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Molt específics | | | | | | | | | | |
| Anti-SRP | | | | Molt específics | | | | | | | | | |
| Anti-Jo-1 | | | 15-20% Sd. Antisintetasa (60-70%) | | | | | | | | | | |
| Anti PM-Scl | | | | 8% | 3% | | | | | | | | |
| | | | | 50%: sd. solapament | | | | | | | | | |
| ANCA-C (PR3) | | | | | | | | | | 50-90% | 20% | <5% | 10% |
| ANCA-P (MPO) | | | | | | | | | | <5% | 20% | <5% | 60% |
| FR | | | 10% | | 30% | | | +/- | 75% | | | | |
| Anti-citrulina | | | | | | | | | 60-80% (especif:91-97%) | | | | |
| ACL | | 5-10% | | | | | | | | | | | |
| Anti-β2-GP1 | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-cardiolipina | | | | | | | | | | | | | |

LEC: lupus eritematós cutani; LECC: lupus eritematós cutani crònic; LECS: lupus eritematós cutani subagut; LECA: lupus eritematós cutani agut; LES: lupus eritematós sistèmic; DM: dermatomiositis; PM: polimiositis; ES: esclerosi sistèmica; GW: granulomatosi de Wegener; CS: Churg-Strauss; MMTc: malaltia mixta teixit connectiu; PAN: poliarteritis nodosa; PAM: poliangeïtis microscòpica; SAF: síndrome antifosfolípid; SS: Sd de Sjögren i AR: artritis reumatoide