

TRACTAMENT AMB 5 FLUOROURACIL TÒPIC

Aquest fàrmac, en el seu ús tòpic, està indicat principalment en el tractament de queratosis actíniques, lesions que solen aparèixer a zones exposades al sol (cara, cap, coll, zona superior del tronc, avant-braços, dors de mans, etc.) És un fàrmac quimioteràpic que quan s'aplica tòpicament (al 5%) dóna lloc a efectes locals.

Forma d'aplicació

- Aplicar una fina capa sobre les lesions 2 cops al dia (matí i vespre) durant 15-20 dies
- Vigili amb l'aplicació del producte a prop dels ulls, el nas i la boca.
- Rentis les mans immediatament després de l'aplicació del producte.
- Una vegada passats els 15-20 dies d'aplicació del producte, deixar d'aplicar-lo i fer tocs d'alcohol (96^a) 2-3 cops al dia durant 15 dies més, fins a la desaparició de la irritació i de les lesions crostoses.

Efectes secundaris

- Aquest producte, de forma gairebé constant, dóna lloc a envermelliment, coïssor, dolor, molèsties locals i formació de crostes a la zona d'aplicació i sovint al voltant d'aquesta zona. En cas que aquesta irritació sigui molt intensa, pot aturar-se uns 2-3 dies l'aplicació del 5-fluorouracil i aplicar-se un antisèptic tòpic (com ara Cristalmina Solución Tópica®). Passats 2-3 dies de la interrupció del tractament, provi reiniciar de nou l'aplicació del producte. Si la irritació és molt intensa o extensa ha de consultar el seu dermatòleg.
- De forma més infreqüent, el 5-FU pot donar lloc a despigmentació de la pell on s'ha aplicat
- Pot donar lloc també a fotosensibilitat (major tendència a patir cremades pel sol) al lloc d'aplicació. Eviti l'exposició al sol, a les làmpades solars i a les cabines de bronzejat.

Precaucions

Aquest tractament no pot aplicar-se en embarassades ni durant la lactància