

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE (AR)

una puntuación de $\geq 6/10$ es necesaria para la clasificación de un paciente con AR definitiva

A. Afectación articular	
1 articulación grande	0
2-10 articulaciones grandes	1
1-3 articulaciones pequeñas (con o sin afectación de articulaciones grandes)	2
4-10 articulaciones pequeñas (con o sin afectación de articulaciones grandes)	3
> 10 articulaciones (almenos 1 pequeña)	5
B. Serología (almenos 1 resultado positivo)	
Factor reumatoide (FR) negativo y anticuerpo anti proteína citrulinada (ACPA) negativo	0
FR débil positivo o ACPA debil positivo	2
FR fuerte positivo o ACPA fuerte positivo	3
C. Reactantes de fase aguda	
PCR Normal y VSG normal	0
PCR anormal o VSG anormal	1
D. Duración de la sintomatología	
<6 semanas	0
≥ 6 semanas	1

Funovits J, Aletaha D, Bykerk V, Combe B, Dougados M, Emery P, Felson D, Hawker G, Hazes JM, Huizinga T, Kay J, Kvien TK, Smolen JS, Symmons D, Tak PP, Silman A. The 2010 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for rheumatoid arthritis: methodological report phase I. Ann Rheum Dis. 2010 Sep;69(9):1589-95