

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO

A) ALARCON-SEGOVIA et al.-

Se considera diagnóstica la presencia del criterio serológico y al menos 3 clínicos. La asociación de edema de manos, Raynaud y acrosclerosis requiere añadir uno de los otros dos criterios,

A. SEROLOGICO
Anti-RNP (*) > 1/1600 (por hemaglutinación)
B. CLÍNICO
<ol style="list-style-type: none">1. Edemas de manos2. Sinovitis3. Miositis (demostrada por datos de laboratorio o biopsia)4. Fenómeno de Raynaud5. Acrosclerosis

Alarcon-Segovia D, Cardiel MM. Comparison between 3 diagnostic criteria for mixed connective tissue disease. Study of 593 patients. J Rheumatol 1989; 16: 328-334

B) KASUKAWA et al.-

El diagnóstico se realiza cuando se cumplen los puntos 1, 2 y 3

1. Uno o los dos síntomas comunes
2. Ac Anti-RNP.
3. Uno o más hallazgos en como mínimo dos de las tres categorías de hallazgos mixtos (A, B, C)

SÍNTOMAS COMUNES

1. Fenómeno de Raynaud
2. Tumefacción los dedos o de las manos

Ac ANTI RNP

HALLAZGOS MIXTOS

- A. Hallazgosseudolupus
 - 1) Poliartritis
 - 2) Linfadenopatía
 - 3) Eritema facial
 - 4) Pericarditis o pleuritis
 - 5) Leucopenia < 4000 o trombopenia < 100.000
- B. Hallazgosseudo ESP
 - 1) Esclerodactilia
 - 2) Fibrosis pulmonar. Patrón restrictivo: capacidad vital <80% o disminución TLCO <70%
 - 3) Hipomotilidad o dilatación del esófago
- C. Hallazgosseudopolimialgia
 - a) Debilidad muscular.
 - b) Aumento sérico de enzimas musculares
 - c) Patrón miogénico por EMG.

Kasukawa, R, Tojo, T, Miyawaki, S. Preliminary diagnostic criteria for classification of mixed connective tissue disease. In: Mixed Connective Tissue Disease and Antinuclear Antibodies, Kasukawa, R, Sharp, G, (Eds), Elsevier, Amsterdam 1987. pp. 41-7.

C) A. SHARP et al.-

- EMTC definida: 4 criterios mayores ó 3 criterios mayores + anti U1RNP >1:4000
- EMTC probable: 3 criterios mayores ó 2 criterios mayores anti U1RNP + exclusión SM + (1,2,3)
- MTC posible: 2 mayores y 2 menores ó 1 mayor + anti U1RNP³<1:1000 pero antiU1RNP>100

CRITERIOS MAYORES

1. **Miositis severa**
2. **Enfermedad pulmonar**
 - b. **Capacidad difusión CO<70%**
 - c. **Hipertensión pulmonar**
 - d. **Lesiones proliferativas vasculares en la biopsia de pulmón**
3. **Fenomeno de Raynaud o hipomotilidad esofágica**
4. **Tumefacción manos o esclerodactilia**
5. **ENAS >1/10.000 y anti U1RNP (+) i anti SM (-)**

CRITERIOS MENORES

1. **Alopecia**
2. **Leucopenia**
3. **Anemia**
4. **Pleuritis**
5. **Pericarditis**
6. **Artritis**
7. **Neuropatia del trigémino**
8. **Erupción malar**
9. **Trombocitopenia**
10. **Miositis ligera**
11. **Edema de manos**