

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDICA (SAF)

Presencia de un criterio clínico y otro analítico en más de una ocasión separadas más de 8 semanas y sin reunir criterios de LES ni otra entidad clínica

A) MANIFESTACIONES CLÍNICAS
<ul style="list-style-type: none">- Trombosis arterial y/o venosa- Abortos y/o muertes fetales de repetición- Trombocitopenia
B) LABORATORIO
<ul style="list-style-type: none">- Ac anticardiolipina (IgG)- Anticoagulante lúpico- Ac anticardiolipina IgM i AL

Harris. Br J Rheumatol 1987; 26:19

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDICA (SAF)

Diagnóstico definitivo de SAF: 2 ó más manifestaciones clínicas más las manifestaciones analíticas.

Diagnóstico probable: 1 manifestación clínica y cifra elevada de antifosfolípidicos (aAFL) o 2 ó más manifestaciones clínicas y niveles bajos de aAFL (IgG o IgM > 2 y < o igual a 5 desviaciones estándares.

A) MANIFESTACIONES CLÍNICAS
<ul style="list-style-type: none">- Pérdida fetal recidivante- Anemia hemolítica- Trombocitopenia- Trombosis venosa- Trombosis arterial- Úlcera pierna- Lívedo reticularis
B) MANIFESTACIONES ANALÍTICAS
Nivel alto de anticuerpos antifosfolípidicos (IgG o IgM > 5 Desviaciones Estándard)

Alarcon Segovia. Sem Arthritis Rheum 1992;21:275-286.