

CRITERIOS DE CLASSIFICACIÓN DE LA ESCLERODERMIA SISTEMICA

Un paciente tiene esclerodermia sistémica si cumple un criterio mayor o dos o más criterios menores

Criterios mayores
<ul style="list-style-type: none">• Esclerodermia proximal• Engrosamiento, retracción e induración simétrica de la piel de los dedos y de la piel proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. Los cambios pueden afectar toda la extremidad, la cara, el cuello y el tronco.
Criterios menores
<ol style="list-style-type: none">1. Esclerodactilia.2. Cicatrices digitales o pérdida de sustancia: areas deprimidas en las puntas de los dedos o pérdida de sustancia de los pulpejos por isquemia3. Fibrosis pulmonar basal bilateral. Patrón reticulado de densidades lineales o lineonodulares bilaterales, más pronunciado en las bases de los dos pulmones en el estudio radiológico de rutina. Debe excluirse enfermedad pulmonar primaria.

The American Rheumatism Association. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee. Arthritis Rheum. 1980May;23 (5):581-590.

