

## CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE SJÖGREN (SS)

Deben cumplir 4 criterios para establecer el diagnóstico. Será posible si sólo se cumplen 3

<b>A. QUERATOCONJUNTIVITIS SECA.</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prueba de Schirmer positiva</li><li>2. Rosa de Bengala positiva:</li><li>3. Prova de fluoresceína positiva.</li></ol>
<b>B. XEROSTOMIA.</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Síntomas de sequedad bucal, y</li><li>2. Disminución de la secreción salival basal y después de estímulo</li></ol>
<b>C. BIOPSIA POSITIVA DE GLANDULA SALIVAL MENOR</b>
<b>D. DATOS DE LABORATORIO DE ENFERMEDAD AUTOIMMUNE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Factor reumatoide positivo, o</li><li>• Ac antinucleares positivos, o</li><li>• Ac anti-Ro o anti-La positivos</li></ul>
<b>Criterios de exclusión</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Linfoma preexistente.</li><li>2. Enfermedad de injerto contra huésped</li><li>3. Inmunodeficiencia adquirida (SIDA).</li><li>4. Sarcoidosis</li></ol>

*Fox RI, Robinson CA, Curd JG et al. Sjögren's Syndrome. Proposed criteria for classification. Arthritis Rheum 1986; 29: 577-585).*